

ご診察いただいた先生へ

保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、子どもたちが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について登園許可証の発行をお願いします。感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育園生活が可能な状態となつてからの登園であるようご配慮ください。

※下記太枠内をご記入願います。

登園許可証(医師意見書)	
キッズガーデンひまわり 施設長殿	園児名 ()
	生年月日 (年 月 日)
疾患名 ()	
症状も回復し、集団生活に支障がない状態になつたので令和 年 月 日から登園可能と判断します。	
	令和 年 月 日
	医療機関
	医師名 印

◎医師が記入した意見書が必要な感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹 (はしか)	発症 1 日前からは発疹出現後の 4 日後まで	解熱後 3 日を経過してから
インフルエンザ	症状がある期間(発症前 24 時間から発病後 3 日程度までが最も感染力が強い)	発症した後 5 日を経過し、且つ解熱した後 2 日を経過するまで(幼児(乳幼児)にあつては、3 日を経過するまで)
風 疹	発疹出現の前 7 日からのち 7 日間程度	発疹が消失してから
水痘 (水ぼうそう)	発疹出現 1~2 日前から痂皮形成まで	全ての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症 3 日前から耳下腺腫脹後 4 日	耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が出現してから 5 日を経過するまで、 且つ全身状態が良好になるまで
結核		医師により感染の恐れがないと認められるまで
咽頭結膜炎 (プール熱・アデノウイルス)	発熱・充血等症状が出現した数日後	主な症状が消え 2 日経過してから
流行性角結膜炎	充血・眼脂等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いので、結膜炎の症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3 週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで、又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症 (O157 ・ O26 ・ O111)		症状が始まり、且つ抗菌薬による治療が終了し、48 時間をあけて連続 2 回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸から 1~2 週間、便から数週間~数か月排出される	医師により感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認めるまで
コロナウイルス感染症		発症から 5 日間経過し、かつ、症状軽快後 1 日経過するまで